



予防接種一覽表

【定期接種一覽】

令和5年4月1日版

対象疾病	ワクチン名・種類	方法	対象者	回数・間隔	標準的接種期間・回数	備考	
ロタウイルスによる胃腸炎	ロタウイルスワクチン(生ワクチン)	経口投与	ロタリックス(1価) 出生6週0日後から24週0日後までの間にある者	ロタリックスを27日以上の間隔を置いて2回経口投与する。 【初回】 生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として実施。	【初回】 1歳になるまでに27日以上の間隔を3回	■同じワクチンで完了することが原則であるが、転居等で同じワクチンの接種ができないやむを得ない事情がある場合、次の接種も可能である。 (1) 1価1回接種済⇒(27日以上)⇒5価⇒(27日以上)⇒5価 (2) 5価1回接種済⇒(27日以上)⇒1価⇒(27日以上)⇒1価 (3) 5価2回接種済⇒(27日以上)⇒1価 ■経口投与後に接種液を吐き出したとしても追加の投与は必要ない。	
			ロタテック(5価) 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者	ロタテックを27日以上の間隔を置いて3回経口投与する。 【初回】 生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として実施。	【初回】 1歳になるまでに27日以上の間隔を2回 【追加】 初回接種(3回)終了後7か月以上の間隔で1回	【初回】 1歳になるまでに、27日から56日までの間隔で3回 【追加】 初回接種(3回)終了後7か月から13か月の間隔で1回	■1歳未満に初回の2回目・3回目の接種を終えられなかった場合は、その分の接種は行わず、初回接種の最後から27日以上の間隔を置いて、追加接種を1回打つ。
Hib感染症(インフルエンザ菌b型)	ヒブワクチン(不活化ワクチン)	皮下注射	生後2か月から5歳未満	【標準】 生後2か月以上7か月未満で接種開始 【初回】 1歳になるまでに27日以上の間隔で3回 【追加】 初回接種(3回)終了後7か月以上の間隔で1回	【初回】 1歳になるまでに、27日から56日までの間隔で2回 【追加】 初回接種(3回)終了後7か月から13か月の間隔で1回	■1歳未満に初回の2回目の接種を終えられなかった場合は、その分の接種は行わず、初回の1回目の接種後27日以上の間隔を置いて、追加接種を1回打つ。	
			(生後7か月以上12か月未満で接種を開始した場合)	【初回】 1歳になるまでに27日以上の間隔で2回 【追加】 初回接種(2回)終了後7か月以上の間隔で1回	【初回】 1歳になるまでに、27日から56日までの間隔で2回 【追加】 初回接種(3回)終了後7か月から13か月の間隔で1回	■1歳未満に初回の2回目の接種を終えられなかった場合は、その分の接種は行わず、初回の1回目の接種後27日以上の間隔を置いて、追加接種を1回打つ。	
			(1歳以上5歳未満で接種を開始した場合)	1回			
小児の肺炎球菌感染症	小児用肺炎球菌ワクチン(不活化ワクチン)	皮下注射	生後2か月から5歳未満	【標準】 生後2か月以上7か月未満で接種を開始 【初回】 27日以上の間隔を置いて3回(ただし、2回目は1歳未満に、3回目は2歳未満に行う) 【追加】 1歳以降に、初回接種終了後60日以上の間隔を置いて1回	【初回】 1歳になるまでに、27日以上の間隔で3回 【追加】 1歳0か月以上1歳3か月未満の期間に、初回接種終了後60日以上の間隔を置いて1回	■初回の2回目を1歳を超えて接種した場合は、初回の3回目は行わず、2回目から60日以上の間隔を置いて追加接種を1回打つ。 ■初回の2回目・3回目の接種を2歳未満に実施できなかった場合は、その分の接種は行わず、初回接種の最後から60日以上の間隔を置いて追加接種を1回打つ。	
			(生後7か月以上12か月未満で接種を開始した場合)	【初回】 27日以上の間隔を置いて2回(ただし、2回目は2歳に至るまでに行う) 【追加】 1歳以降に、初回接種終了後60日以上の間隔を置いて1回	【初回】 1歳になるまでに、27日以上の間隔で2回 【追加】 1歳以降に、初回接種終了後60日以上の間隔を置いて1回	■初回の2回目を2歳未満に行うこととし、それを超えた場合は行わない。	
			(1歳以上2歳未満で接種を開始した場合)	1回接種後、60日以上の間隔をあけてさらに1回			
			(2歳以上5歳未満で接種を開始した場合)	1回			
B型肝炎	B型肝炎ワクチン(不活化ワクチン)	皮下注射	1歳未満(ただし平成28年4月1日以降に生まれた者)	27日以上の間隔で2回接種し、3回目は初回から139日以上あけて1回	生後2か月以上9か月未満	■2回目と3回目は6日以上あける。 ■健康保険で接種した者は、定期接種の対象外。	
ジフテリア百日咳破傷風ポリオ	四種混合ワクチン(不活化ワクチン)	皮下注射	【1期】 生後2か月以上生後90か月(7歳6か月)未満	【1期初回】 20日以上の間隔を置いて3回 【1期追加】 1期初回(3回)終了後、6か月以上の間隔を置いて1回	【1期初回】 生後2か月以上1歳未満の期間に、20日から56日までの間隔を置いて3回 【1期追加】 1期初回接種(3回)終了後、12か月から18か月までの間隔を置いて1回		
ジフテリア破傷風	二種混合ワクチン(不活化ワクチン)	皮下注射	【2期】 11歳以上13歳未満	【2期】 1回	【2期】 11歳以上12歳未満		
結核	BCGワクチン(生ワクチン)	経皮注射	(生後3か月から)1歳未満	1回	生後5か月以上8か月未満		
麻しん・風しん	麻しん風しん混合ワクチン(生ワクチン)	皮下注射	【1期】 1歳以上2歳未満 【2期】 小学校入学前の1年にあたる間(年長さんに該当する年度)	【1期】 1回 【2期】 1回	【1期】 1歳になったらなるべく早く 【2期】 接種期間になったらなるべく早く		
水痘	水痘ワクチン(生ワクチン)	皮下注射	1歳以上3歳未満	2回(1回目と2回目は3か月以上の間隔をあける)	1回目は1歳0か月から1歳3か月になるまでの間に接種し、その後6か月から12か月の間隔をあけて2回目を接種	■任意接種で接種したことがある場合は、その回数分はすでに定期接種をしたものとしてみなす。	
日本脳炎	日本脳炎ワクチン(不活化ワクチン)	皮下注射	【1期】 生後6か月以上生後90か月(7歳6か月)未満	【1期初回】6日以上の間隔を置いて2回 【1期追加】1期初回接種終了後6か月以上の間隔を置いて1回(標準的には概ね1年後に1回)	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間に、6日以上28日までの間隔を置いて2回 4歳に達した時から5歳に達するまでの期間に1回		
			【2期】9歳以上13歳未満	【2期】1回	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間に1回		
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)	ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(不活化ワクチン)	筋肉内注射	小6から高1の女子	<サーバリックス(2価)> 1か月の間隔を置いて2回接種し、その後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて1回接種 <ガーダシル(4価)>※1 2か月の間隔を置いて2回接種し、その後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて1回接種 <シルガード9(9価)> ※2 1回目が15歳未満の場合 6か月の間隔を置いて2回接種 ※1 1回目が15歳の場合 2か月の間隔を置いて2回接種し、その後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて1回接種	中学1年生	■やむをえない場合は、1か月以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔を置いて1回接種する。 ※1 ■やむをえない場合は、1か月以上の間隔を置いて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔を置いて1回接種する。 ※2 ■やむをえない場合は、1回目と2回目の接種は少なくとも5か月以上あける。5か月未満の場合、3回目の接種が必要になる。	

【指定医療機関】※市内医療機関は、1週間程度前までに医療機関へ直接予約をしてください。市外医療機関は、決められた予約日に予約をしてください。

実施場所	電話番号	住所	ロタウイルス	BCG	ヒブ	小児用肺炎球菌	B型肝炎	四種混合	麻しん・風しん混合	水痘	日本脳炎	二種混合	子宮頸がん
橋本内科医院	22-3291	北1東2-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
市立芦別病院	22-2701	本町14	△	△	△	△	△	△	△	△	月水木金 8:30-11:30 (高校生以上)	△	月曜日 要問合せ
勤医協 芦別平和診療所	22-2685	北2西1-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
野口病院	22-2032	北2西1-7	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
砂川市立病院	0125-54-2131	砂川市西4北3-1-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富良野協会病院	0167-23-2181	富良野市住吉町1-30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

接種：月～水、金曜日13:15～15:00、予約：接種日前日の午前中まで
接種：木曜日13:30～15:30、予約：月～金曜日14:00～16:00

【ロタウイルスワクチンの注意事項】

○～基本的にロタリックス(1価)の接種となります。
◎～ロタリックス(1価)又はロタテック(5価)の接種となります。
※接種後は、「腸重積症」に気をつけましょう。様子が気になったらすぐに受診しましょう。

【他の予防接種との接種間隔】

注射生ワクチン → **注射生ワクチン**
27日(4週間)以上の間隔を開ける。
*その他のワクチンについては、間隔に関する規定はありません。
*新型コロナウイルスワクチンを接種する場合は、前後2週間以上あけてください。
接種医療機関に予約をする際に、接種間隔等をご確認ください。

【お問い合わせ】
芦別市健康推進課健康推進係
(市役所1階④番窓口)
〒075-8711 芦別市北1条東1丁目3番地
電話 (0124)27-7365 (直通)