

ロタウイルスワクチンが定期接種になりました！

令和2年10月1日よりロタウイルスワクチンが定期接種になりました。
重症胃腸炎の予防のため、ロタウイルスワクチンを接種しましょう！



■対象者

令和2年8月1日以降に生まれた方

■接種回数


ロタリックス®
経口弱毒生ヒトロタ
ウイルスワクチン
(1価) (2回接種)



接種は生後24週
(約5か月半) まで



ロタテック®
5価経口弱毒生ロタ
ウイルスワクチン
(5価) (3回接種)



接種は生後32週
(約7か月半) まで

■接種方法

経口投与 (飲むワクチン)

★初回接種は、生後6週から生後14週6日まで
に受けてください！

★2回目以降の接種は、生後14週6日の前後い
ずれでも接種できます。

■接種後の注意

接種後は、「腸重積症」に気をつけましょう。様子が気になったらすぐに受診しましょう。

- ・腸重積症は、腸の一部が隣接する腸管にはまり込む病気で、速やかな治療が必要です。
- ・ワクチン接種に関わらず、3か月～2歳くらいまでの赤ちゃんがかかりやすい病気です。
- ・ワクチン接種後 (特に初回接種後) 1～2週間くらいの間は、かかりやすくなると報告されています。
- ・次のような様子が1つでも見られるときは、医療機関を受診しましょう。

- 「突然はげしく泣く」
- 「嘔吐を繰り返す」
- 「便に血が混じる」
- 「ぐったりして顔色が悪い」
- 「機嫌が良かったり不機嫌になったりを繰り返す」

※月齢が進むと、腸重積症にかかりやすくなります。できるだけ腸重積症の起こりにくい早めの時期に接種を受けましょう。**初回接種を生後15週以降に受けることはお勧めしていません。**

■接種医療機関

医療機関名	住 所	電 話	接種できる曜日・時間	ワクチンの種類
橋本内科医院	北1東2-10	0124-22-3291	医療機関に直接ご確認ください。	基本的にロタリックス(1価)の接種となります。
勤医協芦別平和診療所	北2西1-2	0124-22-2685		
砂川市立病院	砂川市 西4北3-1-1	0125-54-2131	月～水、金曜日13:15～15:00 (予約は、接種日前日の午前中まで)	ロタテック(5価)の接種を希望する場合は、直接医療機関にご相談ください。
富良野協会病院	富良野市 住吉町1-30	0167-23-2181	木曜日13:30～15:30 (予約は月～金曜日14:00～16:00)	

■接種を予定される日の1週間程前までに希望される医療機関へ予約してください。

■接種の際は、同封した予診票及び母子健康手帳をご持参ください。

■上記医療機関以外で接種した場合は、全額自己負担になります。

ロタウイルス感染症・ロタウイルスワクチン

【基礎知識編】

ロタウイルスワクチンを接種する前に、必ずこのお知らせを読みましょう！

ロタウイルスって何？



ロタウイルス胃腸炎は、ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期（0～6歳頃）にかかりやすい病気です。感染力が非常に強く、激しい下痢や嘔吐を起こし、脱水症状がひどくなると点滴が必要になることもあります。乳幼児は、特に初めて感染したときに症状が強くなります。

ロタウイルスワクチンってどんなワクチン？

ロタウイルスワクチンは2種類あり、どちらも飲むタイプの生ワクチンです。

2種類のワクチンって何が違うの？



2種類のワクチンの有効性は、同等と考えられています。ロタリックスは1価の弱毒生ウイルスワクチン、ロタテックは5価の弱毒生ウイルスワクチン（それぞれ1種類、5種類の弱毒化したロタウイルスワクチンに含まれています）という違いがありますが、ロタウイルスワクチンは種類の異なるロタウイルスによる急性胃腸炎の重症化予防にも効果があるため、どちらのワクチンを接種しても同様の効果があります。

接種後に吐き出した場合はどうすればいい？

接種後に吐き出した場合でも、再度の接種は必要ないと考えられています。少量でも飲み込んでいれば一定の効果があることや、ロタウイルスワクチンは複数回接種することとなっており、一連の接種で効果が期待できることなどから、吐き出した場合でも1回の接種と考えてください。

心配なこと、
気になることは、
お気軽に下記まで
ご相談ください！



【問合せ】 芦別市健康推進課健康推進係 ☎ (0124) 27-7365 (直通)